



LG ADRENALIN

NY SORT MED HØJT UDBYTTE
OG HØJT OLIEINDHOLD



LG ADRENALIN - HØJT UDBYTTEPOTENTIALE OG HØJT OLIEINDHOLD

- Kraftig efterårsvækst
- Velegnet til middel-sen såning
- Højt olieindhold
- Lav modtagelighed for rodhalsråd
- Lav modtagelighed for kransskimmel
- Medium modtagelighed for lys bladplet
- Resistens for rapsrødsot
- N-FLEX for større udbyttestabilitet
- SCLERO-FLEX for øget tolerance mod knoldbægersvamp

Forhandles af: DLG




GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE LG ADRENALIN:

- ✓ KRAFTIG EFTERÅRSVÆKST
- ✓ VELEGNET TIL MEDIUM-SEN SÅNING
- ✓ SCLERO-FLEX
- ✓ SKULPEOPSPRINGSRESISTENS
- ✓ N-FLEX



Foto: Colourbox



LG ADRENALIN	Standard udbytte, forholdstal	Olie, % ts	Beg. blomst	Plante højde, cm	Lejesæd kar. 0-10
2025	101	52,1	22/4	161	0

Kilde: sortinfo.dk

LG Adrenalin er en nyhed med et år i landsforsøgene og et forholdstal på 101.

Udbyttedata fra hele Europa viser meget højt udbyttepotentiale.

KNOLDBÆGERSVAMP / SCLERO-FLEX

Knoldbægersvamp er en sædskiftesygdom, der forårsages af svampen Sclerotinia sclerotiorum. Smitstoffet fra sclerotier kan overleve i jorden i op til 8-10 år, men efter 4-5 år er meget af smitstoffet gået til grunde. Smitte sker under blomstring, og en lang blomstringsperiode samt fugtige og varme forhold op til og under blomstring kan fremme angreb.

Sygdomsudvikling

Under fugtige jordforhold om foråret spirer sclerotierne i jorden med såkaldte apothecier (frugtleger). Fra disse udslynges sporer, der spredes med vinden over korte afstande. Sporerne spredes til kronblade og løvblade, og når kronbladene i blomstringsperioden falder af, sætter de sig i bladfæsterne, hvorfra svampen trænger ind i planten. Vandtransporten forhindres, og planten nødmodner. Der kan under fugtige forhold ses en hvid vatagtig svampevækst uden på stænglen, og i slutningen af vækstsæsonen ses de små sorte hvileknolde (sclerotier) inde i stænglerne. Ved kraftige angreb kan udbyttetabet være helt op til 50%, fordi planterne nødmodner, og frøene spildes før høst. Der findes effektive bekæmpelsesmidler mod knoldbægersvamp. Det optimale bekæmpelsestidspunkt er st. 65, hvor 50-60% af knopperne på hovedskuddet er sprunget ud. Under en lang blomstring kan der være behov for to sprøjtninger, da effekten af en

sprøjtning kun holder ca. 2 uger. Udfordringen kan være at ramme det optimale bekæmpelsestidspunkt, hvis vejret driller med regn eller blæst.

SCLERO-FLEX

Der er ingen sorter, der har en fuldstændig resistens overfor knoldbægersvamp. LG introducerede i 2024 betegnelsen SCLEROFLEX for sorter, der har høj tolerance overfor knoldbægersvamp. Sorter med SCLERO-FLEX angribes også af knoldbægersvamp, men antallet af inficerede stængler og graden af angreb er lavere end for sorter uden denne egenskab. Tre års forsøg på lokaliteter i tre lande viser, at antallet af inficerede stængler er 57% lavere, og graden af angreb er 44% lavere end for sorter uden SCLERO-FLEX. Det anbefales fortsat, at der sprøjtes mod knoldbægersvamp i SCLERO-FLEX sorter, men der er større fleksibilitet i forhold til sprøjtetidspunktet, og angrebene bliver mindre, selv ved ikke-optimal timing. LG ADRENALIN har SCLERO-FLEX.

